

## Advantix®

### ADVANTIX solution pour spot-on.

**Composition** : pour 1 mL de solution: imidaclopride 100 mg, perméthrine 500 mg, butylhydroxytoluène (E-321) 0,4 mg, excipients : qsp 1 mL.

**Indications** : Chez le chien prévention et traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*). Les puces présentes sur le chien sont tuées en 24 heures qui suivent le traitement. Un seul traitement prévient les ré-infestations par les puces pendant 4 semaines. Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP). Le produit possède une efficacité acaricide et répulsive persistant pendant 4 semaines (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) et 3 semaines (*Dermacentor reticulatus*). Les tiques déjà présentes sur le chien au moment du traitement peuvent ne pas être tuées pendant les 2 jours suivant l'administration du traitement et peuvent rester fixées et visibles. Aussi il est recommandé d'enlever les tiques présentes lors de l'application du traitement, afin d'éviter leur attachement et la prise de repas sanguin. Un seul traitement assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes pendant 2 semaines (*Phlebotomus papatasi*) à 3 semaines (*Phlebotomus perniciosus*), contre les moustiques pendant 2 semaines (*Aedes aegypti*) à 4 semaines (*Culex pipiens*) et contre les mouches d'étable (*Stomoxys calcitrans*) pendant 4 semaines.

**Contre-indications** : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots âgés de moins de 7 semaines et pesant moins de 1,5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue aux principes actifs. Ne pas utiliser chez les chats.

**Effets indésirables** : En de rares occasions, certains chiens traités pourront présenter une sensibilité cutanée passagère (prurit accru, alopecie, érythème au site d'application). Une intoxication après ingestion accidentelle chez le chien est improbable, mais peut survenir dans de rares cas. Lors d'un tel évènement, des signes neurologiques tels que des tremblements et une léthargie peuvent survenir. Un traitement symptomatique doit être instauré par un vétérinaire. Il n'y a pas d'antidote spécifique connu.

**Utilisation durant la gestation et la lactation** : La spécialité peut être utilisée pendant la gestation et la lactation.

**Posologie et rythme d'administration** : 10 mg d'imidaclopride et 50 mg de perméthrine par kg de poids corporel (soit 1 pipette de 0,4 mL pour les chiens de 1,5 kg à 4 kg, 1 pipette de 1 mL pour les chiens pesant de 4 à 10 kg, 1 pipette de 2,5 mL pour les chiens pesant de 10 à 25 kg, 1 pipette de 4 mL pour les chiens pesant de 25 à 40 kg). Pour les chiens de moins de 10 kg : appliquer le contenu de la pipette directement sur la peau entre les omoplates de l'animal ; pour le chiens de plus de 10 kg : répartir le contenu de la

pipette en plusieurs points, sur la ligne du dos. Appliquer uniquement sur une peau saine. Le traitement reste efficace si l'animal est mouillé. Cependant, éviter une exposition intense et prolongée à l'eau. Lors d'exposition répétée à l'eau, la durée d'efficacité peut être réduite. Dans ce cas, un intervalle d'une semaine doit être respecté entre deux applications. Au cas où il serait nécessaire de laver le chien avec un shampoing, il est recommandé de le faire avant application du médicament ou au moins deux semaines après, pour assurer une efficacité satisfaisante du médicament.

**Usage vétérinaire.**

**Présentations** : boîtes de 1 sachet de 4 pipettes : Advantix Très petit chien AMM 6782469, Advantix Petit chien AMM 6782512, Advantix Chien moyen AMM 6782564, Advantix Grand chien AMM 678261 8, du 27/01/04 – boîte de 6 pipettes : Advantix Très petit chien AMM 678247 5, Advantix Petit chien AMM 678252 9, Advantix Chien moyen AMM 678257 0, Advantix Grand chien AMM 678262 4, du 27/01/04 -

**Fabriqué par KVP Kiel, Allemagne – Bayer Santé, 13 rue Jean Jaurès 92807 Puteaux Cedex.**