

FRONTLINE Combo® Spot-On

Composition qualitative et quantitative

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

Fipronil 50 mg. (S)-méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

Fipronil 67 mg. (S)-méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.13 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.07 mg. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

Fipronil 134 mg. (S)-méthoprène 120.6 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.27 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L

Fipronil 268 mg. (S)-méthoprène 241.2 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL

Fipronil 402 mg. (S)-méthoprène 361.8 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml.

Forme pharmaceutique

Solution pour spot-on. Solution claire ambrée.

Indications d'utilisation

A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou les poux broyeurs.

Chez les chiens

Élimination des puces (*Ctenocephalides spp.*).

L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines.

Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application.

Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4

semaines.

Elimination des poux broyeur (*Trichodectes canis*).

Chez les chats

Elimination des puces (*Ctenocephalides spp.*).

L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines.

Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application.

Elimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines.

Elimination des poux broyeur (*Felicola subrostratus*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces* (DAPP).

Posologie

Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat.

Chiens : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée.

Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal (0.67 ml),

Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal (1.34 ml),

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal (2.68 ml),

Chiens de plus de 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal (4.02 ml).

En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines.

Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades par exemple (maladies systémiques, fièvre) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez le chat car cela peut conduire à un surdosage.

Effets indésirables

Chez les chats

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation.

En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée.

Ne pas surdoser.

Chez les chiens

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée. Ne pas surdoser. Ne pas surdoser.

Temps d'attente

Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml FR/V/3168431 0/2003.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml FR/V/3168431 0/2003.

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml FR/V/3168431 0/2003.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml FR/V/7543476 4/2003.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml FR/V/
7543476 4/2003.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml FR/V/
7543476 4/2003.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml FR/V/7565368 8/2003.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml FR/V/
7565368 8/2003.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml FR/V/
7565368 8/2003.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml FR/V/2879019 8/2003

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml FR/V/
2879019 8/2003

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml FR/V/
2879019 8/2003

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml FR/V/8787746 7/2003

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml FR/V/
8787746 7/2003

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml FR/V/
8787746 7/2003

Date A.M.M. 23/01/03.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

Direction France - 13b avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 72 72 63 22 - Fax 04 72 72 32 10

(validé AR - 2/3/2010)

FRONTLINE[®] Spot-On

Composition qualitative et quantitative

FRONTLINE Spot-On Chat

Fipronil 50 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Ethanol 0.05 ml. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml.

FRONTLINE Spot-On Chien S

Fipronil 67 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.134 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.067 mg. Ethanol 0.067 ml. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml.

FRONTLINE Spot-On Chien M

Fipronil 134 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.268 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.134 mg. Ethanol 0.134 ml. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml.

FRONTLINE Spot-On Chien L

Fipronil 268 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Ethanol 0.268 ml. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml.

FRONTLINE Spot-On Chien XL

Fipronil 402 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg. Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Ethanol 0.402 ml. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml.

Forme pharmaceutique

Solution pour spot-on.

Indications d'utilisation

Affections à parasites sensibles au fipronil.

Chez les chats

Traitement curatif et préventif des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*) et par les tiques, élimination des poux broyeurs.

La durée de protection contre les nouvelles infestations est de quatre semaines pour les puces et de deux semaines pour les tiques.

Chez les chiens

Traitement curatif et préventif des infestations par les puces et les tiques, élimination des poux broyeurs.

La durée de protection contre les nouvelles infestations est de deux mois pour les puces et d'un mois pour les tiques.

Le médicament peut être intégré dans un programme thérapeutique de la *Dermatite Allergique par Piqûres de Puces* (DAPP).

Posologie

En application sur la peau.

Chats

Une pipette de FRONTLINE Spot-On Chat par animal (0.5 ml).

Chiens

Chiens de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On S par animal (0.67 ml).

Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On M par animal (1.34 ml).

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On L par animal (2.68 ml).
Chiens de 40 à 60 kg : une pipette de FRONTLINE Spot-On XL par animal (4.02 ml).
Pour les chiens de plus de 60 kg, appliquer une pipette de 4.02 ml ainsi qu'une pipette du volume inférieur approprié. En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines.

Contre-indications

Chez les chats

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Chez les chiens

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre, etc...) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Ce produit a été spécialement développé pour les chiens : ne pas utiliser chez les chats car cela peut conduire à un surdosage.

Effets indésirables

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés :

Chez les chats

Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation.

Chez les chiens

Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation.

Ne pas surdoser.

Temps d'attente

Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations

FRONTLINE Spot-On Chat

FR/V/8481982 4/1996

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml

FRONTLINE Spot-On Chien S

FR/V/7543476 4/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml

Carte de 2 pipettes à embout sécable de 0.67 ml

Carte de 4 pipettes à embout sécable de 0.67 ml

Carte de 8 pipettes à embout sécable de 0.67 ml

Carte de 12 pipettes à embout sécable de 0.67 ml

FRONTLINE Spot-On Chien M

FR/V/8858273 3/1996

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml

Carte de 2 pipettes à embout sécable de 1,34 ml

Carte de 4 pipettes à embout sécable de 1.34 ml

Carte de 8 pipettes à embout sécable de 1.34 ml

Carte de 12 pipettes à embout sécable de 1.34 ml

FRONTLINE Spot-On Chien L

FR/V/6442706 9/1996

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml

Carte de 2 pipettes à embout sécable de 2.68 ml

Carte de 4 pipettes à embout sécable de 2.68 ml

Carte de 8 pipettes à embout sécable de 2.68 ml

Carte de 12 pipettes à embout sécable de 2.68 ml

FRONTLINE Spot-On Chien XL

FR/V/8787746 7/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Date A.M.M. 16/02/96, 12/11/96 et 20/06/01.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

Direction France - 13b avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 72 72 63 22 - Fax 04 72 72 32 10

(validé AR - 2/3/2010)

FRONTLINE[®] Spray Pompe 0.5 ml et 1.5 ml

Composition qualitative et quantitative

Fipronil 0.25 g. Excipient QSP 100 ml.

Forme pharmaceutique

Solution externe.

Indications d'utilisation

Affections à parasites sensibles au fipronil chez les *chiens et chats* de moins de 5 kg pour FRONTLINE Spray Pompe 0.5 ml et de plus de 5 kg pour FRONTLINE Spray Pompe 1.5 ml.

Chez les chiens

Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques.

Elimination des poux broyeur.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les tiques est d'environ 30 jours.

Chez les chats

Prévention et traitement des infestations par les puces.

Elimination des poux broyeurs.

Elimination des tiques.

Prévention des infestations par les tiques pendant 2 semaines.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les puces est d'environ 40 jours.

FRONTLINE Spray Pompe peut être intégré dans un programme thérapeutique de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP)*.

Posologie

Voie d'administration : cutanée, en pulvérisation.

La posologie de base est de 7.5 mg/kg de fipronil soit 3 ml de solution par kg (6 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 2 pressions de la pompe 1.5 ml par kg). Cette posologie peut être portée jusqu'à 15 mg/kg de fipronil soit 6 ml de solution par kg (12 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 4 pressions de la pompe 1.5 ml par kg) pour tenir compte de la longueur des poils et permettre une imprégnation complète de l'animal.

En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Effets indésirables

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après utilisation.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation.

Ne pas surdoser.

Temps d'attente

Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations

Boîte de 1 flacon de 125 ml polyéthylène (rempli à 100 ml) et de 1 pompe doseuse délivrant 0.5 ml par pulvérisation 673 105.8.

Boîte de 1 flacon de 250 ml polyéthylène et de 1 pompe doseuse délivrant 1.5 ml par pulvérisation 673 106.4.

Boîte de 1 flacon de 500 ml polyéthylène et de 1 pompe doseuse délivrant 1.5 ml par pulvérisation 673 107.0.

Date A.M.M. 24/05/94.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

Direction France - 13b avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 72 72 63 22 - Fax 04 72 72 32 10

(validé AR - 29/10/2008)